

CORRECTION FEUILLE 4

Règle de l'Hôpital :

Si f et g sont deux fonctions définies autour d'un point a telles que $f(a) = g(a) = 0$ et $g'(a) \neq 0$, alors

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(a)}{g'(a)}$$

c'est un peu moins fort que ce que je vous ait dit en TD : j'avais dit que $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, ce qui est en fait faux en général : cela ne marche pas pour

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin(1/x)}{x}$$

Cette limite existe (et vaut 0), mais la limite du quotient des dérivées n'existe pas.

Par contre, il est vrai de dire que si la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existe, alors elle est égale à la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$. Comment rédiger tout cela ? Identifiez f et g , écrivez un truc du genre « On cherche à appliquer la règle de l'Hôpital, on calcule donc la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$. », calculez la limite $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$, une fois que c'est fait, écrivez « par la règle de l'Hôpital, cette limite est égale à la limite de départ ».

† Calcul de limite

Exercice 1.

- Comme dans toutes ces limites de fractions rationnelles en $\pm\infty$, c'est la règle des monômes de plus haut degré qui s'applique. Il n'est pas indispensable de s'en souvenir par cœur, il suffit de diviser par autant de puissances de x qu'il faut pour lever l'indétermination. Ici par exemple, on peut diviser par x qui peut être supposé non nul puisqu'on prend la limite en $+\infty$. On écrit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{-7x + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 3 - \frac{4}{x}}{-7 + \frac{2}{x}}$$

et cette forme indéterminée n'en est plus une : le numérateur tend vers $+\infty$ et le dénominateur vers -7 , d'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{-7x + 2} = -\infty.$$

- On procède de même et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{5x^2 + 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}}{5 + \frac{2}{x^2}} = \frac{2}{5}.$$

- De même

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x^2 + 3x - 4}{x^4 - 5x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2 + \frac{3}{x} - \frac{4}{x^2}}{x^2 - \frac{5}{x}} = 0.$$

- Ici c'est un petit peu plus astucieux : on peut appliquer la règle de l'Hôpital : on a

$$(x-1)' = 1 \quad \text{et} \quad (x^n - 1)' = nx^{n-1}$$

donc

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^n - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{nx^{n-1}} = \frac{1}{n}$$

On pouvait aussi penser aux sommes de suites géométriques : $1 + \dots + x^{n-1} = \frac{1-x^n}{1-x}$, doit l'inverse de l'expression dont on recherche la limite.

- Distinguons si $x \rightarrow 1^+$ ou si $x \rightarrow 1^-$. Le numérateur vaut 1 en 1 et le dénominateur tend vers 0^+ pour $x \rightarrow 1^-$ et vers 0^- quand $x \rightarrow 1^+$, donc la limite n'existe pas :

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2x^2 + 3x - 4}{-2x + 2} \text{ n'existe pas.}$$

- On a

$$\forall x \in \mathbb{R}, |e^{-x} \sin(x)| = \left| \frac{\sin(x)}{e^x} \right| \leq \frac{1}{e^x}$$

qui tend vers 0 en $+\infty$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \sin(x) = 0.$$

- Comme la fonction \sin n'a pas de limite en $+\infty$ et que x tend vers $+\infty$, la limite voulue n'existe pas. Plus précisément, si $x \mapsto x \sin(x)$ admettait une limite, elle devrait être nulle puisqu'on a, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\frac{(4n+1)\pi}{2} \sin\left(\frac{(4n+1)\pi}{2}\right) = \frac{(4n+1)\pi}{2} > 0$$

et

$$\frac{(4n+3)\pi}{2} \sin\left(\frac{(4n+3)\pi}{2}\right) = -\frac{(4n+3)\pi}{2} < 0$$

et on voit alors que la fonction $x \mapsto x \sin(x)$ possède des valeurs négatives et positives pour x aussi grand qu'on veut. Or, si la limite est nulle, alors \sin est aussi de limite nulle en $+\infty$, ce qui est absurde.

- Ici, on peut être tenté d'utiliser l'expression conjuguée, mais cela ne marche pas (essayez!, le problème vient du fait que les puissances de x sous les racines ne sont pas les mêmes et donc ne se simplifient pas). On écrit plutôt que, pour $x \geq 0$, on a

$$\sqrt{x+1} - \sqrt{x^2+1} = \sqrt{x+1} \left(1 - \sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}}\right)$$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2+1}{x+1} = +\infty$ (par comparaison des monômes de plus hauts degrés), donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} 1 - \sqrt{\frac{x^2+1}{x+1}} = -\infty$, on a donc une limite de la forme $+\infty \times -\infty$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x^2+1} = -\infty$$

- Cette fois-ci, on peut utiliser l'expression conjuguée et écrire

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} - \sqrt{x-1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(x+1) - (x-1)}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x-1}} = 0.$$

- On ne s'embarrasse pas du x^{122} et on écrit

$$\forall x \geq 1, 0 \leq \frac{2^x + \ln(x)}{3^x + x^{122}} \leq \frac{2^x + \ln(x)}{3^x} = \left(\frac{2}{3}\right)^x + \frac{\ln x}{3^x}.$$

Comme $\ln\left(\frac{2}{3}\right) < 0$, la limite de $\left(\frac{2}{3}\right)^x = e^{x \ln\left(\frac{2}{3}\right)}$ en $+\infty$ est nulle. D'autre part, comme $\ln 3 > \ln e = 1$, on a que $\frac{x}{3^x} = \frac{x}{e^{x \ln 3}} \leq \frac{x}{e^x}$ tend vers 0 en $+\infty$, donc que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{3^x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} \times \frac{x}{3^x} = 0$$

donc que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^x + \frac{\ln(x)}{3^x} = 0$$

et donc que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2^x + \ln x}{3^x + x^{122}} = 0.$$

- Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x} = 1$ (c'est la règle de l'Hôpital), on a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{x^2} = +\infty$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \left(\frac{\sin x}{x^2} \right) = +\infty.$$

- Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + x^2) = +\infty$, on a directement

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + x^2) = +\infty.$$

- De même, on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(1 + x^2) = +\infty.$$

- Ici, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{x} \right) = \frac{\pi}{4}$, d'où

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{x} \right) = \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

- On a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x = +\infty = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x + e^x = +\infty.$$

- Enfin, comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1 + x^2) = +\infty$, on a $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln^3(1 + x^2) = +\infty$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-\ln^3(1+x^2)} = \lim_{y \rightarrow +\infty} e^{-y} = 0.$$

Exercice 2.

- On utilise l'expression conjuguée et on écrit

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1-x} - \sqrt{x+1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2x}{x(\sqrt{1-x} + \sqrt{x+1})} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{2}{\sqrt{1-x} + \sqrt{x+1}} = -1.$$

- C'est encore l'expression conjuguée :

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 4} - 2}{x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x^2 + x + 4} - \sqrt{4}}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + x + 4 - 4}{x(\sqrt{x^2 + x + 4} + 2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 + x + 4} + 2} = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

J'avais également donné l'autre méthode consistant à poser $f(x) = \sqrt{x^2 + x + 4}$ et à voir la limite demandée comme un taux d'accroissement en 0, la limite est alors $f'(0) = \frac{1}{4}$.

Et bien-sûr, on peut utiliser la règle de l'Hôpital, en dérivant en haut et en bas, ce qui revient essentiellement au même.

- Nous allons donner deux méthodes (essentiellement identiques) pour trouver le résultat. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite réelle de terme général

$$u_n = \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

On introduit de plus la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ de terme général

$$v_n = \ln(u_n) = n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right).$$

1. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et posons $N := \frac{1}{n}$. Le terme général de la suite (v_n) se réécrit

$$v_n = \ln(u_n) = \frac{\ln(N+1)}{N}.$$

Si l'on cherche à calculer la limite de (v_n) , on peut reconnaître un taux d'accroissement en 1 de la fonction \ln et écrire

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{N \rightarrow 0} \frac{\ln(1+N) - \ln 1}{N} = \ln'(1) = 1$$

et on en déduit que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{v_n} = e^1 = e.$$

2. On peut remarquer que le terme de (v_n) s'écrit encore

$$v_n = n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) = n(\ln(n+1) - \ln(n)).$$

Or, par le théorème des accroissements finis, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe $x_n \in]n, n+1[$ tel que

$$\ln(n+1) - \ln(n) = \ln'(x_n) = \frac{1}{x_n}.$$

Comme, pour tout n on a $x_n \in]n, n+1[$, il vient

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 < v_n = \frac{n}{x_n} \leq \frac{n}{n+1}$$

donc la suite (v_n) tend vers 1 quand $n \rightarrow \infty$ par le théorème des gendarmes et donc

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} e^{v_n} = e.$$

Dans tous les cas, on a obtenu la limite importante suivante

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n = e.$$

En utilisant la même méthode, essayez de montrer que

$$\forall x \in \mathbb{R}, \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n = e^x.$$

• On a, avec la règle de l'Hôpital que l'on peut appliquer (le vérifier!)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(2x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \frac{\sin(2x)}{2x} = 2.$$

• De même, comme $x \mapsto \sin(2x)$ ne s'annule qu'en 0, que $x \mapsto 2 \cos(2x)$ ne s'annule pas en 0, la règle de l'Hôpital permet d'écrire

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(3x)}{\sin(2x)} = \frac{3 \cos(3 \times 0)}{2 \cos(2 \times 0)} = \frac{3}{2}.$$

• On recycle le calcul de $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ pour écrire

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} \frac{\sin x}{x} = 0.$$

• Et on le recycle encore :

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x^3 - 3x^2}{\sin^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} (2x - 3) \left(\frac{x}{\sin x} \right)^2 = -3.$$

- On utilise la deuxième règle de l'Hôpital. On le fait pour $x \rightarrow 0^-$; pour $x \rightarrow 0^+$ c'est exactement pareil. Le numérateur et le dénominateur tendent vers 0 en 0^- et le dénominateur ne s'annule pas sur $[-1, 0[$. Le numérateur est une fonction dérivable sur $[-1, 0[$, de dérivée $x \mapsto \sin(2x) + 2x \cos(2x)$. De même, le dénominateur est dérivable sur $[-1, 0[$, de dérivée $x \mapsto \frac{2x}{x^2+1}$ qui ne s'annule pas sur $[-1, 0[$. On peut donc appliquer la règle de l'Hôpital et écrire

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x \sin(2x)}{\ln(1+x^2)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(2x) + 2x \cos(2x)}{\frac{2x}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1+x^2) \left(\left(\frac{\sin(2x)}{2x} \right) + \cos(2x) \right) = 2,$$

et de même on obtient $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin(2x)}{\ln(1+x^2)} = 2$ et donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \sin(2x)}{\ln(1+x^2)} = 2.$$

- Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty$ et que \sin n'a pas de limite en $+\infty$, la limite n'existe pas

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin(\ln(x)) \text{ n'existe pas.}$$

- De même, comme \sin n'a pas de limite en $+\infty$, la limite n'existe pas

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \text{ n'existe pas.}$$

- Comme on a

$$\forall x \in \mathbb{R}, \left| x \sin\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq |x|,$$

la limite recherchée est nulle

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) = 0.$$

† *Continuité, prolongement par continuité*

Exercice 3. Soit la fonction

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$x \longmapsto \begin{cases} x^2 - 3x & \text{si } x < -1 \\ 3x + 7 & \text{si } -1 \leq x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \\ \frac{20 \cos(2\pi x)}{x+1} & \text{si } 1 \leq x \end{cases}$$

On a, par définition de f :

$$f(-1) = 4 \text{ et } f(1) = 0.$$

Ensuite, on a

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^-} x^2 - 3x = 4 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -1^+} 3x + 7 = 4,$$

ainsi que

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} 3x + 7 = 10 \text{ et } \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{20 \cos(2\pi x)}{x+1} = 10.$$

Donc,

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 10 \neq 0 = f(1)$$

et on a

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 4 = f(-1).$$

Des calculs ci-dessus, on tire que f est continue en -1 mais pas en 1 . Il est par ailleurs clair que f est continue ailleurs et qu'on a donc

$$DC(f) = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty, 1[\cup]1, +\infty[.$$

Exercice 4. Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et f la fonction

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \begin{cases} \frac{x-4}{x^2-16} & \text{si } x \neq \pm 4 \\ a & \text{si } x = -4 \\ b & \text{si } x = 4 \end{cases}$$

On a

$$\forall x \neq 4, f(x) = \frac{x-4}{x^2-16} = \frac{x-4}{(x-4)(x+4)} = \frac{1}{x+4},$$

d'où

$$\lim_{x \rightarrow -4^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow -4^-} \frac{1}{x+4} = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -4^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \frac{1}{8}.$$

Ainsi, f n'admet jamais de limite en -4 , donc n'y est jamais continue. Elle est continue en 4 si et seulement si $\frac{1}{8} = \lim_{x \rightarrow 4} f(x) = f(4) = b$. On en tire que

$$\forall a, b \in \mathbb{R}, DC(f) = \begin{cases} \mathbb{R} \setminus \{\pm 4\} & \text{si } b \neq \frac{1}{8} \\ \mathbb{R} \setminus \{-4\} & \text{si } b = \frac{1}{8} \end{cases}$$

Exercice 5.

• Soit la fonction

$$f : \mathbb{R} \setminus \{1\} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \frac{|x|^{\frac{3}{2}} - 1}{x-1}$$

La fonction f est clairement continue sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ comme composée, combinaison linéaire et quotient de fonctions continues. Ensuite, on a, en utilisant l'expression conjuguée

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{\frac{3}{2}} - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x^3} - \sqrt{1}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 1}{(x^{\frac{3}{2}} + 1)(x-1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(1+x+x^2)}{(x-1)(x^{\frac{3}{2}} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x + 1}{x^{\frac{3}{2}} + 1} = \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

Ainsi, on peut prolonger f par continuité à \mathbb{R} en posant

$$f(1) := \frac{3}{2}.$$

• Ici, la fonction

$$g : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto \ln(|x|)$$

est continue sur \mathbb{R}^* comme composée de fonctions continues. Par contre, on a

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \ln|x| = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty \notin \mathbb{R},$$

donc g ne peut pas être prolongée par continuité sur \mathbb{R} .

Exercice 6.

1. La fonction $f : x \mapsto x \ln x$ est définie dès que \ln l'est, i.e. sur \mathbb{R}_+^* , d'où

$$D_f = \mathbb{R}_+^*.$$

2. La fonction f est dérivable sur \mathbb{R}_+^* comme produit de fonctions qui y sont dérivables et on a

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, f'(x) = 1 \times \ln(x) + x \times \frac{1}{x} = \ln(x) + 1.$$

La dérivée f' s'annule en e^{-1} , est négative sur $]0, e^{-1}[$ et positive sur $]e^{-1}, +\infty[$, d'où le tableau de variations

x	0	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
$f'(x)$		0	
$f(x)$	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

3. On a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(x) = +\infty.$$

On a donc une branche parabolique de direction O_y en $+\infty$. On a de plus $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) = 0$ par croissances comparées et $f(1) = 0$, avec une tangente d'équation $T : y = f'(1)(x - 1) + f(1) = x - 1$. On en déduit l'allure du graphe de f :




FIGURE 1 – Allure du graphe de $f : x \mapsto x \ln(x)$

† Fonctions de plusieurs variables

Exercice 7.

1. Soit la fonction réelle de deux variables réelles $f : (x, y) \mapsto \frac{1}{x^2+xy+1}$. Cette fonction est définie dès que $x^2 + xy + 1 \neq 0$, i.e. dès que $y \neq -\frac{x^2+1}{x} = -\left(x + \frac{1}{x}\right)$. Étudions donc la fonction $u : x \mapsto -x - \frac{1}{x}$. Cette fonction est définie, continue et dérivable sur \mathbb{R}^* et on a

$$\forall x \neq 0, u'(x) = \frac{1}{x^2} - 1.$$

Le tableau de variations de u est donné par

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$u'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$u(x)$	$+\infty$		2	$+\infty$	$-\infty$	-2	$-\infty$

De plus, on a

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{u(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 - \frac{1}{x^2} = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} u(x) + x = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{x} = 0.$$

On a donc une asymptote oblique en $+\infty$, d'équation $y = -x$. De même, on a

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{u(x)}{x} = -1 \text{ et } \lim_{x \rightarrow -\infty} u(x) + x = 0,$$

donc l'asymptote oblique en $+\infty$ est aussi une asymptote oblique en $-\infty$. On en déduit l'allure du graphe de u et donc le domaine de définition de f , qui est tout le plan, privé de la courbe en rouge ci-dessous :




FIGURE 2 – La fonction f est définie hors de la courbe rouge

2. La fonction $g : (x, y) \mapsto \ln(x + y)$ est définie dès que $x + y > 0$, i.e. dès que $y > -x$. Il s'agit du domaine représenté par les points noirs sur la figure suivante (attention, la ligne verte n'est pas incluse dans le domaine de définition de g) :




FIGURE 3 – Délimitation du domaine de g

3. La fonction $h : (x, y) \mapsto \sqrt{\ln(x - y)}$ est définie dès que $\ln(x - y)$ est défini et est positif ou nulle, i.e. dès que $x - y \geq 1$ i.e. dès que $y \leq x - 1$. Il s'agit du domaine représenté par les points verts sur la figure suivante (ici la ligne verte est incluse dans le domaine de h) :




FIGURE 4 – Délimitation du domaine de h

Exercice 8.

1. Soit la fonction

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto x^2y + \sin(xy)$$

Les dérivées partielles de f peuvent être calculées en tout point $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xy + y \cos(xy) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2 + x \cos(xy) \end{cases}$$

2. La fonction $g : (x, y) \mapsto \frac{x \sin(y) + y \cos(x)}{xy}$ est définie dès que $xy \neq 0$, i.e. dès que $x \neq 0$ et $y \neq 0$ et on peut calculer ses dérivées partielles en chacun de ces points en utilisant la formule de dérivation des quotients :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy \neq 0, \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = \frac{(\sin(y) - y \sin(x))xy - y(x \sin(y) + y \cos(x))}{x^2y^2} \\ = -\frac{\sin x}{x} - \frac{\cos x}{x^2}$$

et

$$\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{(x \cos(y) + \cos(x))xy - x(x \sin(y) + y \cos(x))}{x^2y^2} = \frac{\cos y}{y} - \frac{\sin y}{y^2},$$

d'où

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy \neq 0, \begin{cases} \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = -\frac{\sin x}{x} - \frac{\cos x}{x^2} \\ \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = \frac{\cos y}{y} - \frac{\sin y}{y^2} \end{cases}$$

En considérant $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ comme des fonctions de deux variables, on peut encore les dériver et on remarque que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x, y) = 2x + \cos(xy) - xy \sin(xy) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x, y).$$

De même, avec g on remarque que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 ; xy \neq 0, \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(x, y) = 0 = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(x, y).$$

En fait, ceci est un fait général : sous une hypothèse technique, toute fonction $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ vérifie

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

C'est ce qu'on appelle le théorème de Schwarz.

Exercice 9.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable et posons

$$g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) \mapsto f(xy)$$

Comme f est dérivable, on peut calculer les dérivées partielles de g :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = yf'(xy) \text{ et } \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = xf'(xy).$$

2. On remarque qu'on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = xyf'(xy) = y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y).$$

De plus, la relation $f(\lambda x) = \lambda^2 f(x)$ valable pour tous $\lambda, x \in \mathbb{R}$ implique que l'on peut recalculer les dérivées partielles de g :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, g(x, y) = f(xy) = x^2 f(y)$$

d'où

$$\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 2xf(y).$$

De même, on a

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = x^2 f'(y).$$

Or, la relation trouvée plus haut $x \frac{\partial g}{\partial x} = y \frac{\partial g}{\partial y}$ entraîne alors

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, 2x^2 f(y) = x \frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = y \frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = x^2 y f'(y).$$

En évaluant cette relation en $x = 1$, il vient finalement

$$\forall y \in \mathbb{R}, 2f(y) = yf'(y),$$

comme souhaité. On a maintenant deux méthodes pour finir l'exercice :

* On peut anticiper sur le TD d'équations différentielles et résoudre l'équation

$$xf' - 2f = 0.$$

Résolvons-la sur \mathbb{R}_+^* . D'après le cours sur les équations différentielles, les solutions de cette équation sur \mathbb{R}_+^* s'écrivent $f : x \mapsto k_1 e^{2 \ln x} = k_1 x^2$ avec $k_1 \in \mathbb{R}$. De même, sur \mathbb{R}_-^* , les solutions de cette équation sont données par $f : x \mapsto k_2 e^{2 \ln x} = k_2 x^2$. Comme on veut que f soit une solution sur \mathbb{R} de l'équation et soit continue, on doit avoir $k_1 = k_2$. Ainsi, les solutions sur \mathbb{R} de l'équation différentielle $xf' - 2f = 0$ sont données par

$$f : x \mapsto kx^2, k \in \mathbb{R}.$$

Finalement, les seules fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivables sur \mathbb{R} telles que

$$\forall \lambda, x \in \mathbb{R}, f(\lambda x) = \lambda^2 f(x)$$

sont les fonctions

$$f : x \mapsto kx^2,$$

avec $k \in \mathbb{R}$ un réel quelconque.

* Une autre méthode, beaucoup plus simple, consiste à évaluer la relation $f(\lambda x) = \lambda^2 f(x)$ en $x = 1$ pour obtenir

$$\forall \lambda \in \mathbb{R}, f(\lambda) = f(\lambda \times 1) = \lambda^2 f(1).$$

Ainsi, en posant $k := f(1)$, on obtient que les seules fonctions dérivables $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant $f(\lambda x) = \lambda^2 f(x)$ s'écrivent nécessairement

$$f : x \mapsto kx^2, k \in \mathbb{R}.$$