

Description de l'espace des orbites régulières d'un groupe de réflexions complexes.

- I Groupes de réflexions complexes
- II. Description de  $X/W$  via le morphisme de Lyashko-Looijenga

I. Groupes de Réflexions complexes

1) Définitions

On fixe  $V$  un  $\mathbb{C}$ -ev de dimension  $n < \infty$ .


Def:  $s \in GL(V)$  réflexion = ordre fini +  $\text{codim Ker}(s-1) = 1$   
 $H_s$

$W \subseteq GL(V)$  un Groupe de Réflexions Complexes si il est fini et engendré par des réflexions

Ex:  $s = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{C})$ ,  $H_s = \{x=iy\}$ .

$\langle \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \rangle =: W$  est un GRC d'ordre 16.

$S_n \subseteq GL_n(\mathbb{C})$  via les matrices de permutation.



Def:  $W \subseteq GL(V)$  est irréductible si  $W \hookrightarrow GL(V)$  est une représentation irréductible de  $W$ .

Maschke  $\rightarrow$  On peut toujours se ramener au cas irréductible (1)

Ex: Pour  $\Theta_m \subseteq GL_n(\mathbb{C})$ ,  $D: \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$  est une droite invariante.  
 $\Theta_m \subseteq GL(\mathbb{C}^n/D)$  est un groupe de réflexions irréductible ( $\sim A_{n-1}$ ).

Thm: (Shephard-Todd 54)

Tout GRC irréductible est soit

- Un  $G(m, pm) \rightarrow$  "matrices monomiales  $m \times m$  à coefficients non nul dans  $\mu_m$  et dont le produit des coefficients est dans  $\mu_m$ ."

$$\downarrow$$

$$\left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \right) = G(4, 2, 2)$$

- Une des 34 exceptions  $G_4, \dots, G_{37}$

## 2) Un peu de géométrie.

$W \subset V \hookrightarrow W \subset V^*$  (action contragrédiente), aussi un GRC.

Algébriquement.  $\mathbb{C}[V] = S(V^*)$  (algèbre symétrisée).  
 $\mathbb{C}[V/W] \simeq S(V^*)^W$ .

Théor: (Shephard Todd 54; Chevalley 55)

$W \subseteq GL(V)$  est un GRC  $\Leftrightarrow$  il existe  $f_1, \dots, f_m \in S(V)$  homogènes et tels que  
 $S(V) = \mathbb{C}[f_1, \dots, f_m]$ .

Les degrés  $d_1, \dots, d_m$  ne dépendent que de  $W$  (à réordonnement près) et  
 $W \neq d_1 \dots d_m$ . **Système d'invariants fondamentaux.**

Empirique, on a une  $f^0$  continue  $V \xrightarrow{\quad} \mathbb{C}^m$  qui induit un homéo  $V/W \simeq \mathbb{C}^m$   
 $v \longmapsto f_0(v)$

Ex:  $\mathbb{C}^2 \xrightarrow{\quad} \mathbb{C}^2$   
 $(x, y) \longmapsto (x^2, x^2 + y^2)$  induit un homéo  $\mathbb{C}^2 / G(4, 2, 2) \simeq \mathbb{C}^2$ .

• Pour  $s \in \text{Ref}(W)$ , on pose  $H_s = \text{Ker}(s-1)$ , et  $\mathcal{A} = \{H_s \mid s \in \text{Ref}(W)\}$ .

• Pour  $H \in \mathcal{A}$ ,  $\{w \in W \mid w.h = h \forall h \in H\} = \langle s \rangle \cong \mathbb{Z}/\langle n \rangle$   
(si  $W \subseteq \text{GL}_n(\mathbb{R})$ ,  $e_H = 2$  systématiquement).

On pose  $D = \prod_{H \in \mathcal{A}} (d_H)^{e_H}$  où  $d_H \in V^*$  a  $H$  pour noyau.

C'est une équation algébrique de l'ensemble  $\cup \mathcal{A}$ , la réunion des hyperplans.

Prop:  $D \in S(V^*)^W$ , Pour  $(f_i)$  un système d'invariants de  $W$   
on pose  $\Delta_f = D \in \mathbb{C}[f_1, \dots, f_d]$ . (c'est une équation polynomiale pour  
l'image  $\mathcal{H}$  de  $\cup \mathcal{A}$  dans  $V/W$ : **l'hypersurface discriminante**.)

Ex: Pour  $W = \mathcal{O}(4, 2, 2)$ ,  $D = X^2 Y^2 (X-Y)^2 (X+Y)^2 (X-iY)^2 (X+iY)^2$   
 $= X^2 Y^2 (X^4 - Y^4)^2$ .

Pour  $(P, Q) = (XY^2, X^2 + Y^4)$ , on a  $\Delta_{(P,Q)} = P(Q^2 - 4P^2)$ .

$$= -4P^3 + Q^2 P \in \mathbb{C}[P][Q]$$
$$= PQ^2 - 4P^3 \in \mathbb{C}[P][Q].$$

Def: On pose  $P(W) = \Pi_1(X)$  et  $B(W) = \Pi_1(X/W)$ . On a

Thm (Steinberg) On a une suite exacte courte

$$1 \rightarrow P(W) \rightarrow B(W) \rightarrow W \rightarrow 1$$

issue du revêtement  $X \rightarrow X/W$ .

Ex: Pour  $G_m$ ,  $X/W = \text{Conf}_m(\mathbb{C})$  et  $B(G_m) = B_{\text{Br}}^m$  le groupe de Brauer <sup>4</sup> "unramifié"  
(3)

### 3) Bien engendré, mal engendré, densité régulière.

Déf:  $W \in GL(V)$  irréductible est bien engendré si il peut être engendré par une famille de  $\dim V$  réflexions.

ex: Coxeter  $\Rightarrow$  bien engendré;  $G(4, 2, 2)$  mal engendré (ou même trois réflexions).

Théo (Bemis 02) La multiplicité de  $\mathcal{H}$  en 0 est le nombre de réflexions minimales pour engendrer  $W$ .  $\rightarrow$  c'est une notion géométrique!

Théo (Bemis 15) + (Orlik Solomon 80)  
 $W$  irréductible est bien engendré ssi pour tout système  $\mathcal{J}$  d'invariants fondamentaux,  $\Delta_{\mathcal{J}}$  vu comme polynôme en  $X_m$ , est unitaire de degré  $m$ .  
 $\frac{\partial \Delta_{\mathcal{J}}}{\partial X_m} \in \mathbb{C}^*$

Ex: Ça ne marche pas pour  $G(4, 2, 2) \rightarrow PQ^2 - 4P^3$   $\begin{cases} \rightarrow$  pas unitaire en  $\mathbb{Q} \\ \rightarrow$  pas de deg 2 en  $P$ . \end{cases}

Cor: On peut toujours (quitte à changer la variable) écrire

$$\Delta_{\mathcal{J}} = X_m^m + d_{m-2} X_m^{m-2} + \dots + d_1 X_m + d_0$$

où  $d_i \in \mathbb{C}[X_1, \dots, X_{m-1}]$ .

Si  $W$  est mal engendré, on peut chercher un groupe  $W_b$  tel que  $W = C_{W_b}(g)$  où  $g$  est "régulier" par un certain  $\xi \in \mathfrak{p}_d$ .

Alors  $V/W \cong (V_b/W_b)^{\mathfrak{p}_d}$  et  $(V_b/W_b)^{\mathfrak{p}_d} \cong X/W$ .

## II. Description de $X/W$ via le morphisme de Lyashko Looijenga

### 1) Le morphisme de Lyashko Looijenga

On fixe  $W$  bien engendré et irréductible. Décrire  $X/W$  est utile pour comprendre le groupe  $B(W)$ .

On écrit  $\Delta_f = X_m^m + d_{m-2} X_m^{m-2} \dots + d_0$ .

On relie les coefficients/racines, les racines de  $\Delta_f(x_1, \dots, x_{m-1}, T) \in \mathbb{C}[T]$  ont 0 pour contre (= leur somme admissible).

Def: On définit  $\Pi(W)$  comme l'ensemble des racines de  $\{\Delta_f(x_1, \dots, x_{m-1}, T) \in \mathbb{C}[T]\}$ .

Geométriquement, pour une branche  $\{v \in W \mid f_i(v) = x_i \text{ pour } i \leq m-1\}$ , on prend l'intersection de cette branche avec  $\mathcal{H}$ , que l'on translate de  $f_m(v)$ .

Ex: Pour  $W = \mathbb{C}^2$ , on peut écrire  $\Delta_f = Y^2 - X^4$ ,  $\Pi: (a, b) \mapsto \begin{cases} -b - a^2 \\ -b + a^2 \end{cases}$ .

L'ensemble de  $\Pi$  est un espace de conf, homeo à  $\mathbb{C}^m$  via les fonctions symétriques élémentaires. Pour cette id on trouve

$$\Pi: (a, b) \mapsto (-2b, b^2 - a^4)$$

Prop:  $\Pi$  est homogène de degré  $\deg f_m = h$ .

$$\begin{cases} \Pi^{-1}(0) = \mathcal{O} \\ x \in \mathcal{H} \Leftrightarrow \text{DET} \Pi(x) \end{cases}$$

En twistant  $\mathbb{C}^2$  par l'homeo

$$(x, y) \mapsto \left(\frac{1}{2}x, -y + \frac{1}{4}x^2\right)$$

$(2u, -v^2) \mapsto (u, v)$

On trouve  $(a, b) \mapsto (a, b^4)$

Théo (Boris 15) + Douvropoulos 17.

l'application  $\Gamma$  est un revêtement ramifié de deg  $\frac{n! h^n}{|W|}$   
il ramifie précisément en les  $x$  tels que  $\Gamma^{-1}(x)$  contient des points multiples.

Un chemin  $\gamma: [0,1] \rightarrow V/W$  induit un chemin  $\Gamma(\gamma)$  dans l'espace des configurations. On veut décrire les fibres de  $\Gamma$  pour obtenir des propriétés de revêtement.

### 2) Tunnels et étiquettes

On introduit le "point" base  $\mathcal{U} = \{x \in X/W \mid \Gamma^{-1}(x) \cap \mathbb{R}_+ = \emptyset\}$ .  
C'est un ouvert dense et contractile

Def: Un kunel circulaire est un couple  $(x, \theta) \in \mathcal{U} \times [0, 2\pi]$ .  
Une étiquette au chemin  $\gamma: t \mapsto e^{i t \theta} x$  de  $\mathcal{U}$  dans  $\mathcal{U}$ .


Comme  $\Gamma$  est homogène,  $\Gamma(\gamma(t)) = e^{i t \theta} \Gamma(x)$ .  
+  $e^{i \theta} x \in \mathcal{U}$ .

Prop: La classe  $S$  de  $(x, \frac{2\pi}{n})$  dans  $\pi_1(X/W, \mathcal{U})$  ne dépend pas de  $x$ .

### Lemme: Règle d'Herwih

Soit  $\gamma$  un chemin dans  $\mathcal{U}$ . Si  $\forall t \in [0,1], (x(t), \theta)$  est un kunel circulaire  
dans  $\mathcal{U}$  avec  $\theta \in [0, 2\pi]$   
alors tous les  $(x(t), \theta)$  sont homotopes et représentent le même élément de  $\pi_1(X/W, \mathcal{U})$   
i.e.  $e^{i \theta} \gamma(t) \in \mathcal{U}$ .


Soit  $x \in V/W$ , on numérote les points de  $\Gamma(x)$  (sans multip)



- Sans horaire à partir de midi +  $\epsilon$
- module croissant
- 0 en dernier si besoin.

Rq: On peut "déplacer le centre" en jouant sur le paramètre  $f_m(v)$ , pour désingulariser si besoin.

Déf: Pour  $x \in \mathcal{U}$ , on définit la tête de  $x$  par un kernel circulaire.



En procédant récursivement, on étiquette tous les points de  $\Gamma(x)$ .  
On définit ainsi  $clbl(x)$

Lemme:  $\Delta_g: X/W \rightarrow \mathbb{C}^*$  induit un morphisme "longueur"  $f: B(W) \rightarrow \mathbb{Z}$ .

Prop: Pour  $x \in V/W$ , le produit (dans l'ordre) des verres de  $clbl(x)$  est  $\delta$ .

Pour  $a \in \Gamma(x)$  de multiplicité  $m$ , la longueur des verres correspondant de  $clbl(x)$  est  $m$

Théorème: (Basis 15). On pose  $P$  l'ensemble des paires composées  
 d'un élément de  $E_m$  ; d'une suite de kumels dont le  
 produit est  $\delta$  et dont les longueurs  
 sont compatibles avec les multiplicités

l'application  $(\Pi, \text{dbl}) : V/W \rightarrow P$  est bijective

Les fibres de  $\Pi$  sont donc indexées par les décompositions de  $\delta$   
 en produit de kumels (de longueurs compatibles).

Thm: (Basis 15) Il y a un nombre fini de kumels (à homotopie près).  
 $(B(W))$  est engendré par les kumels, et avec les relations.  
 $s \cdot t = \pi$  où  $s, t, \pi$  sont des kumels

### 3) Cas de $(X/W)^{\text{red}}$

Thm (Basis 15)  
 $[x \in (X/W)^{\text{red}}] \Leftrightarrow \begin{cases} \Pi(x) \text{ est invariant par } (\mu_d)^h = \mu_{d'} \\ \text{et } \text{dbl}(x) \text{ invariant sous une action } \mathbb{Z}^{h'} \end{cases}$   
 $\mathbb{Z}(\delta_1, \dots, \delta_p) = (\delta_2 \dots \delta_p, \delta_1^S)$   
 $\underline{d} = \frac{d}{dh}$   
 $h' = \frac{h}{dh}$

$\rightarrow$  étendre ce résultat à  $(V/W)^{\text{red}}$

$+ \mathcal{U}^{\text{red}} \rightsquigarrow$  plusieurs cc contradictiles  $\rightarrow$  catégorie, engendrée  
 par des "kumels".

L'extension à  $(V/W)^{\text{red}}$  permet de gérer la situation locale  
 autour de points de  $(\mathfrak{gl})^{\text{red}}$  (groupes paraboliques).